Foglio di lavoro No. ____a	Bassa atmosfera (troposfera)	classe	data
	Ozono	nome	

L'ozono e le sue proprietà chimiche

C 1 Traccia la seconda struttura di risonanza della molecole di ozono qui di seguito.

C 2 Spiega perchè la molecola di O₃ ha un carattere bipolare e confrontala con la molecola di CO₂ e la molecola di H₂O.

Diversamente dalla molecola lineare CO₂, la molecola O₃ è angolare così come la molecola H₂O. Sebbene tutti gli atomi di ossigeno abbiano la stessa elettronegatività, la struttura di risonanza mostra che l'atomo di ossigeno al centro è più positivo degli atomi di ossigeno ai lati. Questa distribuzione di carica è in qualche modo simile ma opposta a quella nelle molecole d'acqua, in cui l'ossigeno al centro è più negativo degli atomi di idrogeno ai lati. La conseguenza di questa distribuzione di carica è che la molecola di ozono ha una carattere bipolare.

C 3 Se l'ozono reagisce con un alchene (ozonolisi), la molecola di alchene è spezzata a livello del doppio legame C=C. I prodotti di questa reazione sono due composti carbonilici. Trascrivi il nome dei prodotti dell'ozonolisi di:

- 2-butano
- 2-metil-2-butano

ozono e 2-butano danno (2x) etanale (acetaldeide) e ossigeno

ozono e 2-metil-2-butano danno isopropanone (acetone), etanale e ossigeno

Foglio di lavoro No. ____b	Bassa Atmosfera (troposfera)	classe	data
	Ozono	nome	

<ul style="list-style-type: none">● T di ebollizione = -112.5° C● T di fusione = -251.4° C● $\mu = -0.49$ D● colore bluastrastro● odore caratteristico● solubile in solventi organici ad es. in CF₂Cl₂● tossico● O₂/O₃ (w (O₃) < 10% stabile sotto < 100° C● O₃(l), O₃(s) esplosivo durante il contatto	<p>Forte agente ossidante:</p> $\text{O}_3(\text{g}) + 2 \text{e}^- + 2 \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{O}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $E^\circ = 2.07 \text{ V}$ $E = E^\circ + \frac{0.059 \text{ V}}{2} \bullet \log(c^2[\text{H}_3\text{O}^+])$ <p>Esempi di reazioni di ossidazione con l'ozono:</p> <p>1) $\text{O}_3 + 2 \text{I}^- + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + \text{I}_2 + 2 \text{OH}^-$</p> <p>2) $4 \text{O}_3 + \text{PbS} \longrightarrow \text{PbSO}_4 + 4 \text{O}_2$</p>
---	---

C 4 L'ossidazione da ozono procede meglio a pH alto o basso? Giustifica la tua risposta utilizzando le informazioni nel riquadro sopra.

L'ossidazione da Ozono si verifica più facilmente a bassi valori di pH (alte concentrazioni di H₃O⁺). Puoi dedurre questo da:

1. Nella reazione: $\text{O}_3(\text{g}) + 2 \text{e}^- + 2 \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{O}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ sono consumati ioni H₃O⁺. (I due elettroni derivano dalle specie ossidate)

2. Il potenziale dell'elettrodo E è più grande tanto è più grande il termine $\log(c^2[\text{H}_3\text{O}^+])$.

3. Nella reazione $\text{O}_3 + 2 \text{I}^- + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + \text{I}_2 + 2 \text{OH}^-$ sono prodotti ioni ossidrilici. A bassi valori di pH sono neutralizzati dagli ioni idronio (H₃O⁺) e non interferiscono con altre specie.

C 5 Gli Ioni ioduro possono essere ossidati anche dal cloro molecolare. Trascrivi lo schema di reazione e spiega la differenza con la reazione 1 nel riquadro sopra.

In questa reazione non c'è un trasferimento diretto di elettroni dagli ioni ioduro alle molecole di cloro. Questo non sarebbe possibile con l'ozono come agente ossidante. Oltre all'ozono è necessario un altro partner di reazione che possa accettare un atomo di ossigeno ed entrambi gli elettroni. Nella reazione 1 qui sopra, questo partner è l'acqua che accetta gli elettroni e un atomo di ossigeno e forma due ioni ossidrilici.

C6 Nelle goccioline di nuvole, l'ozono ossida l'acido solforoso (anidride solforosa più acqua). Questa ossidazione è più efficiente a pH elevati.

- Discuti il risultato.
- Riferisciti ai tuoi risultati di C4.

Il potenziale di ossidazione dell'ozono non è il solo a dipendere dal pH. Anche il potenziale di riduzione dell'acido solforoso dipende dal pH. Quando il pH aumenta, il potenziale di ossidazione dell'ozono ($c^2[\text{H}_3\text{O}^+]$)– diminuisce meno di quanto aumenti il potenziale di riduzione del dell'acido solforoso ($c_4[\text{H}_3\text{O}^+]$).

$$E = E^\circ + \frac{0,059 \text{ V}}{2} \bullet \log(c_4[\text{H}_3\text{O}^+])$$

Le differenze di potenziale di ossidazione dell'acido solforoso con l'ozono sono 1.90V a pH=0 e 2.71V a pH=14. (Calcolati con l'equazione di "Nerst").